

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ДЕПАНТОЛ®

Регистрационный номер

Торговое название препарата Депантол®

Лекарственная форма суппозитории вагинальные

Состав

Один суппозиторий содержит: декспантенола (D-пантенола) – 0,1 г, хлоргексидина биглюконата (хлоргексидина) 0,016 г (соответствует хлоргексидина биглюконата раствора 20% - 0,0852 г), полиэтиленоксидной основы (полиэтиленоксида 1500, полиэтиленоксида 400) – достаточное количество для получения суппозитория массой 3,0 г.

Описание

Суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Фармакологическая группа

Противомикробное и противопротозойное средство

Код АТХ

G01AX

Фармакологические свойства

Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, входящий в состав препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; дрожжи, дерматофиты, простейшие (*Trichomonas vaginalis*). К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Декспантенол, входящий в состав препарата, стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Депантол® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Показания к применению

Препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктирующих методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии).

Лечение острых и хронических вагинитов; эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных эктопией шейки матки.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации

Депантол® разрешен к применению в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, проходящие после отмены препарата.

Форма выпуска

Депантол® суппозитории вагинальные по 5 суппозиториям в контурной ячейковой упаковке, 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Особые указания

Депантол® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
факс (8312) 30-72-28
тел (8312) 78-80-88